

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 8:00 - 9:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 4:30 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:

- ✗ В день перед процедурой пищу не принимать.
- ✓ Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• С 18 часов дня, предшествующего обследованию, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 18 до 20 часов нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• С 2:30 содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 2:30 до 4:30 нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• В 4:30 принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилла соответствует времени окончания приема жидкости.

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12
При себе иметь большую тканевую простынь.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 10:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 5:30 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:

- ✗ В день перед процедурой пищу не принимать.
- ✓ Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• С 18 часов дня, предшествующего обследованию, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 19 до 21 часов нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• С 3:30 содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 3:30 до 5:30 нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• В 5:30 принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилы соответствует времени окончания приема жидкости.

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12
При себе иметь большую тканевую простынь.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 11:00 - 12:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 6:30 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:

- ✗ В день перед процедурой пищу не принимать.
- ✓ Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• С 18 часов дня, предшествующего обследованию, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 19 до 21 часов нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• С 4:30 содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 4:30 до 6:30 нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• В 6:30 принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилла соответствует времени окончания приема жидкости.

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12
При себе иметь большую тканевую простынь.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 13:00 - 14:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 11:00 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:

- ✗ В день перед процедурой пищу не принимать.
- ✓ Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• С 21 часа дня, предшествующего обследованию, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 21 до 23 часов нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• С 9:00 содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 9:00 до 11:00 нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• В 11:00 принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилла соответствует времени окончания приема жидкости.

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12
При себе иметь большую тканевую простынь.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 15:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 12:30 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:



В день перед процедурой пищу не принимать.



Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• **С 21 часа дня, предшествующего обследованию**, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, **с 21 до 23 часов** нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• **Во время приема препарата нужно двигаться:** ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• **С 10:30** содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, **с 10:30 до 12:30** нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• **В 12:30** принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенного содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилла соответствует времени окончания приема жидкости.

• **Во время приема препарата нужно двигаться:** ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• **КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!**



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста **не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12**
При себе иметь большую тканевую простынь.

ВАШЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 16:00 - 17:00



Уважаемый пациент, впереди важное обследование — колоноскопия. Пожалуйста, уделите особое внимание этапу подготовки. Ваша тщательная подготовка — это залог того, что доктор сможет детально изучить состояние кишечника и не пропустить важные нюансы. В случае несоблюдения рекомендаций точность диагностики может снизиться, а процедуру, возможно, придется повторить. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы диагностика прошла для вас успешно и результативно!

ЗА 5 ДНЕЙ ДО ПРОЦЕДУРЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ:

РАЗРЕШАЕТСЯ	НЕЛЬЗЯ!
✓ Молочные продукты - сыр, кефир, творог, сметана. ✓ Мясо и продукты, заменяющие мясо – отварная (печеная) рыба, отварное куриное филе, вареная колбаса высшего сорта, отварные яйца, омлет без добавок. ✓ Прозрачные жидкости вода, чай без чаинок, прозрачные бульоны.	✗ Хлеб, крупы, овощи и фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи, варенья, морские водоросли, грибы, картошку. ✗ Нельзя принимать лекарства, содержащие железо, уголь; Де-нол; Улькавис (препараты висмута).

За два дня до исследования принять слабительное Форлакс 2 раза в день по 1 пакету утром и вечером. В течение двух дней, предшествующих исследованию принимать Метеоспазмил по 1-й капсуле 2 раза в день. В день исследования в 13:30 утра принять Метеоспазмил одну капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого и снятия спазма.



НАКАНУНЕ:

- ✗ В день перед процедурой пищу не принимать.
- ✓ Можно сахар, леденцы, профильтрованный чай, прозрачные (не окрашенные) напитки, минеральная или питьевая вода, профильтрованные бульоны.

• С 21 часа дня, предшествующего обследованию, содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 21 до 23 часов нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра!

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.



В ДЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

• С 11:30 содержимое одного флакона препарата Эциклен вылить в прилагаемую мерную емкость и развести водой до метки 0,5 литра. В течение последующих 2-х часов, с 11:30 до 13:30 нужно выпить полученный раствор и дополнительно 2 мерных емкости воды (литр воды). Всего 1,5 литра. Пол-литра раствора Эциклена выпивается медленно в течение часа. Затем медленно, в течение часа выпивается литр воды.

• В 13:30 принять Метеоспазмил 1 капсулу. Это необходимо для удаления из кишки пенистого содержимого (без чего осмотр невозможен) и снятия спазма. Время последнего приема Метеоспазмилла соответствует времени окончания приема жидкости.

• Во время приема препарата нужно двигаться: ходить по квартире, выполнять круговые движения корпусом, приседания, массаж живота по часовой стрелке.

• КЛИЗМ НЕ ДЕЛАТЬ!



Если у Вас появятся вопросы по поводу подготовки, пожалуйста не меняйте схемы подготовки без согласования с нами. Свяжитесь с нами по телефону: (831) 262-12-12
При себе иметь большую тканевую простынь.